

くすりのしおり

内服剤

2016年04月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ラベキュアパック 800

主成分：パリエット錠 10mg；ラベプラゾールナトリウム (Pariet Tablets 10mg - Rabeprazole sodium)
サワシリン錠 250；アモキシシリン水和物 (Sawacillin Tablets 250 - Amoxicillin hydrate)
クラリス錠 200；クラリスロマイシン (Clarith Tablets 200 - Clarithromycin)

剤形：1. パリエット錠 10mg；淡黄色の錠剤、直径 6.7mm、厚さ 3.6mm
2. サワシリン錠 250；うすいだいだい色の錠剤、直径 10.0mm、厚さ 4.7mm
3. クラリス錠 200；白色の錠剤、直径 8.6mm、厚さ 5.4mm

シート記載：（表）ラベキュアパック 800、1 日分（朝、夕）
（裏）ラベキュアパック 800 の服用方法



この薬の作用と効果について

パリエット錠 10mg は胃粘膜のプロトンポンプを阻害し、胃酸の分泌を抑制して抗生物質（サワシリン錠 250 とクラリス錠 200）の抗菌作用を高め、サワシリン錠 250 とクラリス錠 200 はヘリコバクター・ピロリ菌に対し、抗菌作用を示します。

通常、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。伝染性単核症、腎障害、心疾患、肝障害がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<<< :医療担当者記入>>
- ・通常、成人は 1 回パリエット錠 10mg を 1 錠（ラベプラゾールナトリウムとして 10mg）、サワシリン錠 250 を 3 錠〔アモキシシリン水和物として 750mg（力価）〕、クラリス錠 200 を 2 錠〔クラリスロマイシンとして 400mg（力価）〕を 1 日 2 回、7 日間服用します。
必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・錠剤はかんだり、くだいたりせず飲みかしてください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。次に飲む時間が近い場合は、飲み忘れた分は飲まないで 1 回分を飛ばし、次に飲む時間に 1 回分を飲んでください。2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹、蕁麻疹、下痢、軟便、味覚異常、腹痛、腹部膨満感、吐き気・嘔吐、便秘、舌炎、胃部不快感、食欲不振、鼓腸放屁、頭痛、発熱、幻覚、失見当識、意識障害、せん妄、躁病、振戦、しびれ（感）、耳鳴、聴力低下、嗅覚異常、口腔内びらん、歯牙変色、筋肉痛、カンジダ症、動悸、かゆみなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・気分が悪い、発汗、息苦しい、発疹、顔面のむくみ、けいれん [ショック、アナフィラキシー]
- ・体がだるい、発熱、息切れ、鼻血・皮下出血、赤褐色の尿 [汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少、溶血性貧血、顆粒球減少、白血球減少]
- ・皮膚や白目が黄色くなる、体がだるい、食欲不振 [劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全]
- ・発熱、から咳、息苦しい [間質性肺炎、好酸球性肺炎、PIE 症候群]
- ・発熱、全身倦怠感、皮膚・眼・口内に発疹ができる・赤くなる [中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症、紅皮症]
- ・尿量が減る、顔や手足がむくむ、発熱 [急性腎不全、間質性腎炎]

- ・吐き気・嘔吐、けいれん、頭痛、意識障害 [低ナトリウム血症]
- ・脱力感、筋肉痛、褐色の尿 [横紋筋融解症]
- ・腹痛、頻回の下痢、血便 [大腸炎]
- ・胸痛、動悸、胸部の不快感 [QT 延長、心室頻拍 (トルサード・ド・ポアントを含む)、心室細動]
- ・紫斑 [アレルギー性紫斑病]
- ・発疹、発熱 [薬剤性過敏症症候群]
- ・項部硬直、発熱、頭痛、吐き気・嘔吐 [無菌性髄膜炎]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

Drug Information Sheet("Kusuri-no-Shiori")

Internal

Published: 04/2016

The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response, patients should understand their medication and cooperate with the treatment.

Brand name: Rabecure PACK 800

Active ingredient: Pariet Tablets 10mg – Rabeprazole sodium

Sawacillin Tablets 250 – Amoxicillin hydrate

Clarith Tablets 200 – Clarithromycin

Dosage form: 1. Pariet Tablets 10mg, pale yellow tablet, diameter 6.7 mm, thickness 3.6 mm; 2. Sawacillin Tablets 250, light orange tablet, diameter 10.0 mm, thickness 4.7 mm; 3. Clarith Tablets 200, white tablets, diameter 8.6 mm, thickness 5.4 mm

Print on wrapping: (front) ラベキュアパック 800, 1 日分(朝, 夕)
(back) ラベキュアパック 800 の服用方法



Effects of this medicine

Pariet Tablet 10mg suppresses gastric acid secretion by inhibiting proton pump in the gastric mucosa, and enhances the effects of the antibiotics (Sawacillin Tablets 250 and Clarith Tablets 200). Sawacillin Tablets 250 and Clarith Tablets 200 show antibacterial actions against Helicobacter pylori.

It is usually used to treat gastric ulcer, duodenal ulcer, gastric MALT lymphoma, idiopathic thrombocytopenic purpura, Helicobacter pylori infection after endoscopic therapy for early-stage gastric cancer or Helicobacter pylori gastritis.

Before using this medicine, be sure to tell your doctor and pharmacist

- If you have previously experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicines.
If you have infectious mononucleosis, renal/hepatic disorder or heart disease.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)

Dosing schedule (How to take this medicine)

- Your dosing schedule prescribed by your doctor is<< to be written by a healthcare professional>>
- In general, for adults, take 1 tablet of Pariet Tablets 10mg (10 mg of rabeprazole sodium), 3 tablets of Sawacillin Tablets 250 (750 mg [titer] of amoxicillin hydrate) and 2 tablets of Clarith Tablets 200 (400 mg [titer] of clarithromycin) at a time, twice a day for 7 days.
Strictly follow the instructions.
- Swallow the medicine without chewing or crushing.
- If you miss a dose, take the missed dose as soon as possible. However, if it is almost time for the next dose, skip the missed dose and continue your regular dosing schedule. You should never take two doses at one time.
- If you accidentally take more than your prescribed dose, consult with your doctor or pharmacist.
- Do not stop taking this medicine unless your doctor instructs you to do so.

Precautions while taking this medicine

Possible adverse reactions to this medicine

The most commonly reported adverse reactions include rash, hives, diarrhea, loose stool, taste abnormality, stomachache, abdominal bloating, nausea, vomiting, constipation, glossitis, stomach discomfort, loss of appetite, flatulence/flatulence, headache, fever, hallucination, disorientation, disturbance of consciousness, delirium, mania, tremor, numbness (feeling of numbness), ear ringing, hearing impairment, olfactory disorder, oral erosion, tooth discoloration, muscle pain, candidiasis, palpitation and itch. If any of these symptoms occur, consult with your doctor or pharmacist.

The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated in brackets. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor immediately.

- feeling unwell, sweating, breathing difficulty, rash, swelling of face, convulsion [shock, anaphylaxis]
- dullness, fever, shortness of breath, nose/subcutaneous bleeding, reddish brown urine [pancytopenia, agranulocytosis, thrombocytopenia, hemolytic anemia, granulocytopenia, leukopenia]
- yellowness in the skin or whites of the eyes, dullness, loss of appetite [fulminant hepatitis, hepatic function disorder, jaundice, hepatic failure]
- fever, dry cough, shortness of breath [interstitial pneumonia, eosinophilic pneumonia, PIE syndrome]
- fever, general malaise, rash/redness in the skin/eyes/mouth [toxic epidermal necrolysis, mucocutaneous ocular

- syndrome, erythema multiforme, acute generalized exanthematous pustulosis, erythroderma]
- decreased urine output, swelling of face/limbs, fever [acute renal failure, interstitial nephritis]
 - nausea/vomiting, convulsion, headache, disturbance of consciousness [hyponatremia]
 - weakness, muscle pain, brown urine [rhabdomyolysis]
 - stomachache, frequent diarrhea, bloody stool [colitis]
 - chest pain, palpitation, chest discomfort [QT prolongation, ventricular tachycardia (including torsade de pointes), ventricular fibrillation]
 - purpura [allergic purpura]
 - rash, fever [drug-induced hypersensitivity syndrome]
 - stiffness in the neck, fever, headache, nausea/vomiting [aseptic meningitis]

The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult with your doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above.

Storage conditions and other information

- Keep out of the reach of children. Store away from direct sunlight, heat and moisture.
- Discard the remainder. Do not store them.

For healthcare professional use only / /

For further information, talk to your doctor or pharmacist.