

くすりのしおり

内服剤

2017年09月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：パリエット錠 20mg

主成分：ラベプラゾールナトリウム (Rabeprazole sodium)

剤形：淡黄色の錠剤、直径 7.2mm、厚さ 3.6mm

シート記載：パリエット 20



この薬の作用と効果について

胃粘膜細胞の胃酸分泌機構を阻害することで胃酸分泌を抑制します。それにより胃や十二指腸の潰瘍を速やかに治癒し、逆流性食道炎に伴う痛みや胸やけなどをやわらげます。

通常、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、逆流性食道炎などの治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。肝障害がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・胃潰瘍、十二指腸潰瘍：通常、成人は1回主成分として10mgを1日1回服用しますが、症状により1回20mgを1日1回に増量されることがあります。この薬は1錠中に主成分20mgを含みます。服用する期間は胃潰瘍、吻合部潰瘍8週間まで、十二指腸潰瘍では6週間までです。
逆流性食道炎：通常、成人は1回主成分として10mgを1日1回服用しますが、症状により1回20mgを1日1回に増量されることがあります。この薬は1錠中に主成分20mgを含みます。服用する期間は8週間までです。また、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な逆流性食道炎では、1回10mgまたは20mgを1日2回、さらに8週間服用します。ただし1回20mg1日2回は重度の粘膜傷害がある場合のみです。
いずれの場合も、必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・錠剤はかんだり、くだいたりせず飲みかしてください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。次に飲む時間が近い場合は、飲み忘れた分は飲まないで1回分を飛ばし、次に飲む時間に1回分を飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹、じんま疹、かゆみ、下痢、軟便、腹痛、腹部膨満感、便秘などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・呼吸困難、じんま疹、めまい [ショック、アナフィラキシー]
- ・発熱、貧血、歯肉出血や皮下出血 [汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少、溶血性貧血]
- ・全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる [劇症肝炎、肝機能障害、黄疸]
- ・発熱、から咳、呼吸困難 [間質性肺炎]
- ・発熱、広範囲の赤い発疹、眼・口・陰部のただれ [中毒性表皮壊死症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑]
- ・尿量減少、むくみ、発熱 [急性腎障害、間質性腎炎]
- ・吐き気や嘔吐、けいれん、頭痛、意識障害 [低ナトリウム血症]
- ・筋肉痛、脱力感、赤褐色尿 [横紋筋融解症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

Drug Information Sheet("Kusuri-no-Shiori")

Internal

Revised: 09/2017

The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response, patients should understand their medication and cooperate with the treatment.

Brand name:Pariet Tablets 20mg

Active ingredient:Rabeprazole sodium

Dosage form:pale yellow tablet (diameter: 7.2 mm, thickness: 3.6 mm)

Print on wrapping:(Face) パリエット 20mg
(Back) パリエット, 20, Pariet



Effects of this medicine

This medicine inhibits the mechanism of gastric acid secretion in gastric mucosal cells to suppress gastric acid secretion. It consequently results in rapid healing of gastric and duodenal ulcer, and relieves pain and heartburn attributed to reflux esophagitis.

It is usually used in the treatment of gastric ulcer, duodenal ulcer, and reflux esophagitis.

Before using this medicine, be sure to tell your doctor and pharmacist

- If you have previously experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicines.
If you have liver problems.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)

Dosing schedule (How to take this medicine)

- Your dosing schedule prescribed by your doctor is((to be written by a healthcare professional))
- For gastric ulcer and duodenal ulcer: In general, for adults, take 10 mg of the active ingredient at a time, once daily. However, the dosage may be increased to 20 mg at a time, once daily, according to the symptoms. This preparation contains 20 mg of the active ingredient in a tablet. Duration of taking the medicine is up to 8 weeks for gastric ulcer and anastomotic ulcer; 6 weeks for duodenal ulcer.
For reflux esophagitis: In general, for adults, take 10 mg at a time, once daily. However, the dosage may be increased up to 20 mg at a time, once daily. This preparation contains 20 mg of the active ingredient in a tablet. Duration of taking the medicine is up to 8 weeks. When proton pump inhibitor treatment is ineffective, take 10 mg or 20 mg at a time, twice daily for further 8 weeks. However, a dose of 20 mg at a time, twice daily is only used in patients with severe mucosa injury.
Strictly follow the instructions in any case.
- Swallow the tablet without chewing or crushing.
- If you miss a dose, take a dose as soon as possible when you remember that you missed a dose. However, if it is almost time for the next dose, skip the missed dose and continue your regular dosing schedule. You should never take two doses at one time.
- If you accidentally take more than your prescribed dose, consult with your doctor or pharmacist.
- Do not stop taking this medicine unless your doctor instructs you to do so.

Precautions while taking this medicine

Possible adverse reactions to this medicine

The most commonly reported adverse reactions include rash, hives, itching sensation, diarrhea, loose stool, abdominal pain, abdominal bloating and constipation. If any of these symptoms occur, consult with your doctor or pharmacist.

The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated in brackets. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor immediately.

- breathing difficulty, hives, dizziness [shock, anaphylaxis]
- fever, anemia, gum bleeding, subcutaneous bleeding [pancytopenia, agranulocytosis, thrombocytopenia, hemolytic anemia]
- general malaise, decreased appetite, yellowing in the skin or white of the eye [fulminant hepatitis, hepatic dysfunction, jaundice]
- fever, dry cough, breathing difficulty [interstitial pneumonia]
- fever, widespread red rash, erosion in the eye, mouth or genitalia [toxic epidermal necrosis, Stevens-Johnson syndrome, erythema multiforme]
- decreased urine output, edema, fever [acute kidney injury, interstitial nephritis]
- nausea, vomiting, convulsion, headache, impaired consciousness [hyponatremia]

- muscular pain, weakness, reddish brown urine [rhabdomyolysis]

The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult with your doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above.

Storage conditions and other information

- Keep the medicine out of the reach of children. Store it away from direct sunlight, heat and moisture.
- Discard the remainder. Do not store them.

For healthcare professional use only / /

For further information, talk to your doctor or pharmacist.