

# 胃内視鏡検査前に注射をされた方へ

## — 注意していただくこと —

検査おつかれ  
さまでした。

時：分

頃になりましたら、

水を少し飲んでみて、むせないようでしたら食事が甘いものを取るようになってください。検査後はめまいがしたり、フラフラしたりすることがあります。危険ですので、数時間は車の運転等をしないでください。

本日、検査前に行った注射は「グルカゴンGノボ 注射用1mg」というおクスリです。このおクスリは胃腸の動きを抑えることで検査を容易にし、その検査精度を高めるために使用いたしました。

まれに検査1～2時間後に「冷や汗」、「脱力感」、「空腹感」などの症状がでることがあります。これは一時的に血液中の糖分が少なくなることがあるためです。

通常は「ジュース・あめ・砂糖・食事など」をとることで、すぐに良くなりますので、このような症状を感じたときはすぐにためしてください。つらいときにはすぐに医師・看護師にお申し出ください。

このような症状に注意してください。

好ましいたべもの


砂糖が含まれるもの



冷や汗

脱力感

空腹感



消化が良いもの



帰宅後、気分が悪いなど、異常があった場合はすぐに医療機関へ連絡してください。  
また次回の検査時には医師・看護師にその旨をお伝えください。

施設名