

# くすりのしおり

外用剤

2017年10月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 商品名: レクタブル 2mg 注腸フォーム 14 回

主成分: ブデソニド (Budesonide)

剤形: 注腸フォーム剤

シート記載: レクタブル 2mg 注腸フォーム 14 回



## この薬の作用と効果について

合成副腎皮質ホルモン剤であるブデソニド製剤で、局所で抗炎症効果を発揮し、大腸の潰瘍の状態を改善します。

通常、潰瘍性大腸炎（重症を除く）に用いられます。

## 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（ : 医療担当者記入）
- ・通常、成人は1回あたり1プッシュ（主成分として2mg）を1日2回直腸内に噴射します。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・手指や目などに付着した場合は、速やかに水で洗い流してください。
- ・使用を忘れた場合は、気がついたときに1回分を使用してください。ただし、次の使用時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分使用してください。絶対に2回分を一度に使用してはいけません。
- ・誤って多く使用した場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で使用を止めないでください。

## 生活上の注意

- ・水痘（水ぼうそう）または麻疹（はしか）に感染しないように注意し、感染が疑われる場合は直ちに受診してください。
- ・薬の働きが強まるおそれがありますので、グレープフルーツジュースを飲むのは控えてください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、頭痛、不眠、めまい、痔、胃潰瘍、にきび、手足のむくみなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、火気、高温、湿気を避け、立てた状態で保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄するときは、各地方自治体により定められたアルミ容器の廃棄方法に従ってください。
- ・生ワクチンの接種を受けるときは、必ず医師に相談してください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。