

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

慢性便秘症治療薬

モビコール[®]配合内用剤HD

MOVICOL[®]

新発売

薬価基準収載

新発売のご案内

謹 啓

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社ならびに弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、この度、慢性便秘症治療薬「モビコール[®]配合内用剤LD」に加え、「モビコール[®]配合内用剤HD」を2022年5月20日（金）に発売いたしますので、製品概要および各種コードのご案内を申し上げます。

今後とも、従来に増しますご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹 白

発売日：2022年5月20日（金）

※詳細は次頁以降をご参照ください。

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限
モビコール [®] 配合内用剤HD	100包	699059426	350004	2023年7月

製品概要／各種コード

販売名	モビコール®配合内用剤HD
剤形(色・性状)	散剤(白色の粉末)
製造販売承認番号(承認日)	30300AMX00033 (2021年1月25日)
薬価基準収載医薬品コード	2359110B2025
レセプト電算処理システムコード	622881501
薬価	131.60円/1包
薬価基準収載日	2021年11月25日
規制区分	処方箋医薬品 (注意－医師等の処方箋により使用すること)
有効期間	3年
貯法	室温保存(高温を避けて保存すること)
JANコード	 4 987699 059426
統一商品コード	699059426
HOTコード	1288155010101
調剤包装単位<GS1>	 (01)04987699459424
販売包装単位<GS1>	 (01)14987699059423
元梱包装単位<GS1-128>	24987699059420

包装

●アルミフィルム包装(調剤包装単位) ※1包中に13.7046g含有



販売名	包装	サイズ(縦×横×厚み)mm 理論値
モビコール®配合内用剤HD	2包	約120×約140×約4

●個装箱（販売包装単位）



一括表示面

- アルミフィルム包装 2包×10が1束になっており、5束入っています。
- 服薬指導箋が1束10部入っています。

販売名	包装	サイズ(縦×横×高さ)mm 理論値	重量(g) 理論値	包装薬価
モビコール®配合内用剤HD	100包	146 × 310 × 125	1730.1	13,160円

●梱包箱（元梱包装単位）

販売名	包装	入数	サイズ(縦×横×高さ)mm 理論値	重量(kg) 理論値	包装薬価
モビコール®配合内用剤HD	100包	6個	465 × 330 × 282	11.03	78,960円

服薬指導箋（LD・HD共通）

モビコール®配合内用剤LD モビコール®配合内用剤HDを服用される方へ

お薬の飲み方

- モビコール®は、**水に溶かして服用**するお薬です。
- 年齢によって1日あたりの服用量が異なります。

表 1日あたりの服用量の目安

	2～6歳	7～11歳	12歳以上
飲み始め	LD 1回 1包/日 HD —	LD 1回 2包/日 HD 1回 1包/日	LD 1回 2包/日 HD 1回 1包/日
もっとも多い場合	LD 4包/日 HD 2包/日	LD 4包/日 HD 2包/日	LD 6包/日 HD 3包/日

※1回あたりの最大服用量はLD2包、HD1包まで ※1日あたりの最大服用量はLD4包、HD2包まで

※服用は1日1～3回とし、併せてLD6包であれば(朝・昼・夕食各2包)または(朝2包、夕食2包)など、服用回数を2回以上に分けて服用する(1回あたりの最大服用量を超えないよう注意)

お薬の溶かし方

- このお薬は、LD1包あたりコップ1/3杯程度(約60mL)、HD1包あたりコップ2/3杯程度(約120mL)の水に溶かします。
- 溶かした後、すぐに服用できない場合は、ラップなどでフタをして、冷蔵庫で保管してください。
- 溶かした後、1度にすべて服用しきれない場合は数回に分けて服用してもかまいません。その場合は、1日あたりの服用量をその日中に飲みきるようにしてください。

水での服用が難しい場合、他の飲料に溶かすこともできます。

- ・その場合はなるべく速やかに服用してください。
- ・温かいものにモビコール®を溶かす場合は30～40℃まで冷ましてください。

ジュース、味噌汁、スープなど

モビコール®の服用量は医師と相談しながら調節します。調節方法の目安については裏面をご参照ください。

■保管上のお問い合わせ(開封前):
モビコール®は室温(1～30℃)で保管します。夏の車内やキッチン、冬の暖房器具のそばなど高温の場所に放置しないでください。

※ 1日あたりの服用量調節の目安

■便の状態と調節方法は参考とし、実際の服用量の増減については、医師や薬剤師とご相談ください。
※下記の表は一つの事例として紹介していますが、LD2包は、HD1包に換算できます。

便の状態	調節方法					
①かたくなり、コロコロしている便	②夜間、コロコロ便がこつこつした便	③夜間、かたくなり、コロコロしている便	④やめられず、頻りに排便する便	⑤やめられず、頻りに排便する便	⑥ゆるくなり、水のような便	⑦水のような便

2～11歳
次の日、LDを1包/日増やす(増やしすぎるとはげはけなど、2日連続での服用は行わない)
変更なし
LDを1包/日減らす
LDを2包/日減らすまたは休薬

12歳以上
次の日、HDを1包/日増やす(増やしすぎるとはげはけなど、2日連続での服用は行わない)
変更なし
HDを1包/日減らすまたは休薬

※基本的に、医師へ相談した上で服用量を調節するようにしてください。
※増量や下痢などの症状があらわれた場合には減量や休薬・中止を考慮する場合がありますので、医師、薬剤師にご相談ください。

服用上の注意点

- モビコール®は水に溶かして服用しますが、この時の水はほとんどが便となり、したがって、モビコール®を溶かす水以外に適切な量の水分補給をすることが大切です。
- お薬の減量や休薬のタイミングが早すぎると再び便秘になってしまうことがあります。お薬の休薬などについては、規則的な排便がある場合でも医師に相談し、指示にしたがってください。

まれに以下のような症状があらわれます。その場合にはがまんせず服用を中止し、すぐに医師または薬剤師にご連絡ください。

皮膚のかゆみ、じんま疹、のどのかゆみ、息苦しさ、どきき、など

患者さんが小児の場合、本人では症状に気がつかない場合もあります。上記の症状に加えて不機嫌、元気がないなど、様子がついつもと異なると感じた場合には、すぐに医師に連絡するか、医療機関を受診するようにしてください。

気になることがある場合は医師または薬剤師にご相談ください。

「モビコール」及び「MOVICOL」は、Norgineグループの登録商標です。

EAファーマ株式会社 2021年10月現在 MVC-HD3C



製造販売元

EAファーマ株式会社
東京都中央区入船二丁目1番1号



プロモーション提携

エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10