



動画で詳しく解説!

スマートフォンや  
タブレットで視聴が  
できます

# モビプレップ® の飲み方【2杯1杯法】



右のQRコードから大腸内視鏡検査の説明や検査における注意点、モビプレップの説明などの  
**動画全編** (約11分半) がご覧になれます。パソコンから動画をご覧になる方は


<http://www.eapharma.co.jp/patient/products/moviprep/> の「2杯1杯法の方はこちら」にアクセスしてください。

## 準備のしかた


右のQRコードから**準備のしかたの動画** (約1分半) がご覧になれます。



★の目印まで  
水を入れる



上から押す



よく振って  
粉末を溶かす




2リットルまで  
水を入れてよく振る



## 服用のしかた

右のQRコードから**服用のしかたの動画** (約3分半) がご覧になれます。

コップ1杯を10～15分かけてゆっくりと服用します。



## 服用時の注意点

- ① 服用のしかたは、必ず医師・看護師・薬剤師等の指示に従ってください。
- ② 一人では服用しないでください。
- ③ 服用前に便秘症状 (前回の排便日が2日以上前) または下痢症状が続いている方は、事前に医師・看護師・薬剤師等に連絡してください。



次の症状があらわれた場合には、がまんせずに直ちに服用を中止し、医師・看護師・薬剤師等に連絡してください。服用後に同様の症状があらわれた場合にも、同様にご連絡ください。

- ・気分がわるい
- ・吐き気がする
- ・吐いた
- ・お腹が痛い
- ・顔が青ざめる
- ・めまいがする
- ・寒気がする
- ・顔がむくむ
- ・息苦しい
- ・じんましんがでる など

# 服用・排便チェックシート

★便の状態があてはまるものに○をつけてください。

便がほぼ透明になったらOK!

★1杯(約180mL)を約10~15分で、お飲みください。		排便なし	固形状態	泥状態	カスがある	透明
		×				
ステップ <b>1</b>	モビプレップ® 1杯目					
	モビプレップ® 2杯目					
	水またはお茶 1杯					

ステップ <b>2</b>	モビプレップ® 1杯目					
	モビプレップ® 2杯目					
	水またはお茶 1杯					

ステップ <b>3</b>	モビプレップ® 1杯目					
	モビプレップ® 2杯目					
	水またはお茶 1杯					

★ここまでの合計は、おおよそモビプレップ® 1L + 水 500mL になります。

まだ便が透明にならない場合は ↓ 次のステップに進んでください。

ステップ <b>4</b>	モビプレップ® 1杯目					
	モビプレップ® 2杯目					
	水またはお茶 1杯					

ステップ <b>5</b>	モビプレップ® 1杯目					
	モビプレップ® 2杯目					
	水またはお茶 1杯					

ステップ <b>6</b>	モビプレップ® 1杯目					
	モビプレップ® 2杯目					
	水またはお茶 1杯					

★各ステップでモビプレップ® 2杯服用後、「水またはお茶」を必ず1杯以上飲んでください。

これで終了です。お疲れさまでした。