

## くすりのしおり

622082201

2011年7月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

**商品名：アズロキサ錠 15mg**

主成分：エグアレンナトリウム水和物（Egualen sodium hydrate）

剤形：淡青色の錠剤、直径 8mm、厚さ約 3.8mm

シート記載：（表）アズロキサ錠 15mg、15mg、KO15

（裏）AZULOXA TAB.15mg、アズロキサ錠、15mg

**この薬の作用と効果について**

胃粘膜の被覆保護作用があり、胃粘膜の損傷を抑制し、胃潰瘍治癒を促進します。

通常、胃潰瘍の治療に H<sub>2</sub> 受容体拮抗薬と併用されます。**次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。**

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

**用法・用量（この薬の使い方）**

- ・ **あなたの用法・用量は** ：医療担当者記入 **《**
- ・ 通常、成人は 1 回 1 錠（主成分として 15mg）を 1 日 2 回朝食後と就寝前に服用しますが、H<sub>2</sub> 受容体拮抗薬と併用されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 飲み忘れた場合は気付いたときに 1 回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は飲まないでおき、次に飲む時間から飲んでください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

**生活上の注意**

- ・ 尿の色が青味を帯びることがありますが、心配ありません。

**この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）**

主な副作用として、口渇感、口唇乾燥感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

**保管方法その他**

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

**医療担当者記入欄**      年      月      日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。