


くすりのしおり

内服剤

2012年09月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。	
商品名: ES ポリタミン配合顆粒 主成分: 8種の必須アミノ酸および3種の非必須アミノ酸(Eight essential amino acids and three non-Essential amino acids) 剤形: 白色～淡かっ色の顆粒剤 シート記載: ES ポリタミン配合顆粒 2g	
この薬の作用と効果について 本剤の主成分であるアミノ酸は、からだをつくるタンパク質の構成成分であり、不足するアミノ酸を補給して栄養状態を改善します。 通常、食欲不振などでタンパク質の不足または栄養状態が悪い場合や手術前後で食事が制限されている際のアミノ酸補給に用いられます。	
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 <ul style="list-style-type: none">・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。肝性昏睡または肝性昏睡のおそれがある。腎障害、高窒素血症がある。・妊娠または授乳中・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。	
用法・用量（この薬の使い方） <ul style="list-style-type: none">・ あなたの用法・用量は <<< :医療担当者記入>>・ 通常、成人は1日2～8gを1～3回に分けて服用します。治療を受ける疾患や年齢・症状・体重により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。・ 飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。2回分を一度に飲んではいけません。・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。	
生活上の注意	
この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 主な副作用として、発疹、吐き気、嘔吐、胸やけ、腹部膨満感、下痢などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 該当する記載事項はありません。 以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。	
保管方法 その他 <ul style="list-style-type: none">・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。	
医療担当者記入欄 年 月 日	

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。