

くすりのしおり

620755001

2009年11月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ヘパン ED 配合内用剤

主成分：アミノ酸、糖質、脂質、電解質、ビタミン剤などを配合した肝不全用成分栄養剤（Elemental diet for hepatic failure）

剤形：散剤

シート記載：ヘパン ED 配合内用剤、80g：約 310kcal

**この薬の作用と効果について**

肝不全患者用の栄養剤で、血漿や脳内の遊離アミノ酸のバランスを是正し、脳内モノアミン代謝異常を改善、また血漿アンモニア濃度を低下させ、肝性脳症の昏睡時間を短縮する効果があります。

通常、肝性脳症を伴う慢性肝不全患者の栄養状態の改善に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。糖尿病、ステロイド剤を使用している患者で高血糖、肝臓以外に原因のあるアミノ酸代謝異常
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 妊娠を希望する
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** < > : 医療担当者記入 >
- ・ 通常、成人は 1 回 1 包（80g）を約 250mL の水またはぬるま湯に溶かし、約 300mL（約 1kcal/mL）として、1 日 2 回食事と一緒に服用します。年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 溶かした液は、原則として 6 時間以内に飲み終わるようにし、やむをえず保存する場合は冷蔵庫に入れて 24 時間以内に使用してください。
- ・ 飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く 1 回分を飲んでください。ただし、次回の決められた飲む時間が近い場合は、飲み忘れた分を飲んでから次に飲むまでの時間をあけて、できる限り決められた回数飲むようにしてください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意**この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）**

主な副作用として、腹部膨満、下痢、嘔気、嘔吐、食欲不振、発疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、高温、湿気を避け、遮光して保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。