

# くすりのしおり

内服剤

2018年11月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 商品名：モビコール配合内用剤

**主成分：**マクロゴール 4000 (Macrogol 4000)  
塩化ナトリウム (Sodium chloride)  
炭酸水素ナトリウム (Sodium bicarbonate)  
塩化カリウム (Potassium chloride)

**剤形：**白色の散剤

**シート記載：**慢性便秘症治療薬 モビコール配合内用剤 MOVICOL 6.9g



## この薬の作用と効果について

主にマクロゴール 4000 の高い浸透圧効果により、消化管内に水分を保持することで、用量依存的に便の排出を促します。

通常、慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）の治療に用いられます。

## 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。腸閉塞、腸管穿孔、炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎、クローン病、中毒性巨大結腸症など）が確認されているまたは疑われる。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）

- ・1包あたりコップ 1/3 程度（約 60mL）の水に溶解します。

通常、2歳以上7歳未満の幼児は初回用量として1回1包を1日1回服用します。以降、症状に応じて適宜増減され、1日1～3回服用しますが、最大服用量は1日4包（1回2包）までです。増量は2日以上の間隔をあけて行い、増量幅は1日1包までです。

通常、7歳以上12歳未満の小児は初回用量として1回2包を1日1回服用します。以降、症状に応じて適宜増減され、1日1～3回服用しますが、最大服用量は1日4包（1回2包）までです。増量は2日以上の間隔をあけて行い、増量幅は1日1包までです。

通常、成人および12歳以上の小児は初回用量として1回2包を1日1回服用します。以降、症状に応じて適宜増減され、1日1～3回服用しますが、最大服用量は1日6包（1回4包）までです。増量は2日以上の間隔をあけて行い、増量幅は1日2包までです。

いずれの場合も、必ず指示された服用方法に従ってください。

- ・飲み忘れた場合は、いつでも飲むことができますが、2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、下痢、腹痛、発疹、紅斑、血管浮腫（顔面のはれ、呼吸困難）、蕁麻疹、かゆみなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・蕁麻疹、呼吸困難、顔のむくみ [ショック、アナフィラキシー]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

### 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・服用時に溶解しますが、やむを得ず保存する場合は冷蔵庫で保存し、できる限り速やかに服用してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

### 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。